

پایان نامه های مورد بررسی سال ۱۳۹۶

- (۱) بررسی شیوع آدنومیوزیس در نمونه های پاتولوژی هیستریکتومی بیمارستان آیت اله روحانی بابل
بین سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۵)
- (۲) رابطه میزان بازگشت قطعه ST بعد از انجام Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) با پیش آگهی درمان در مبتلایان به انفارکتوس قلبی همراه با بالا رفتن
قطعه ST)
- (۳) بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی و نتایج درمان آن با متوترکسانت
- (۴) مقایسه ی یافته های بالینی، بیوشیمیایی و اندوسونوگرافی در بیماران با درگیری پانکراتوبیلیاری با
و بدون اعتیاد به اپیوم)
- (۵) بررسی patency گرافت های بیماران CABG شده ، در بیماران تحت آنژیوگرافی کرونری ، در
بیمارستان آیت اله روحانی بابل از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶)
- (۶) مقایسه اثر آرامبخشی پروپوفول-کتامین و پروپوفول-فنتانیل در کولونوسکوپي
- (۷) مقایسه ی یافته های بالینی، بیوشیمیایی و اندوسونوگرافی در بیماران با درگیری پانکراتوبیلیاری با
و بدون اعتیاد به اپیوم)
- (۸) بررسی همراهی آدنومیوزیس با سایر ضایعات آندومیومتر در نمونه های پاتولوژی هیستریکتومی
بیمارستان آیت اله روحانی بابل بین سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۵)
- (۹) بررسی بیان مارکر CD10 در سلولهای استرومایی و نئوپلاستیک آدنوکارسینوم کولون و پولیپ های
آدنوماتوس و نقش آن در افتراق این دو ضایعه
- (۱۰) مقایسه توده استخوانی در زنان یائسه دارای استئوآرتریت و زنان یائسه سالم
- (۱۱) مقایسه میزان بروز مارکر های ایمونوهیستوکیستمیک CK19، HBME1، TROP-2 در بیماران
مبتلا به PTC در بیمارستان های آیت الله روحانی و شهید بهشتی
- (۱۲) ارتباط بین خونریزی دیورتیکولار و آترواسکلروزیس پیشرفته
- (۱۳) پیگیری طولانی مدت کودکان متولد شده از مادران HBS Ag + در شهرستان بابل
- (۱۴) فیبریلاسیون دهلیزی در نارسایی قلبی جبران نشده: عوامل همراه، میزان خطر ترومبوآمبولی و
سیر داخل بیمارستانی
- (۱۵) ارزیابی بالینی تاثیر تعبیه CRT-D در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن بستری در بیمارستان
آیت الله روحانی بابل در سالهای ۹۶-۹۷)
- (۱۶) پیگیری طولانی مدت کودکان متولد شده از مادران HBS Ag + در شهرستان بابل
- (۱۷) بررسی فراوانی زیر گروه های مولکولی مختلف در بیماران با سرطان پستان که از سال ۱۳۸۸
تا ۱۳۹۵ به بیمارستان روحانی مراجعه کرده اند

- ۱۸) وضعیت توده استخوان و عوامل موثر در کاهش آن در زنان یائسه
- ۱۹) بررسی بی حسی وریدی منطقه ای با تورنیکت ساعد و بالای بازو در جراحی های دست
- ۲۰) مقایسه اثر دگزامتازون تزریقی بر سطح خونی گلوکز در بیماران دیابتی و غیر دیابتی تحت جراحی کاتاراکت
- ۲۱) ارتباط سطح فاکتور XIII و فیبرینوژن با ترومبوز وریدی عمقی و آمبولی ریه در بیماران بستری بیمارستان آیت الله روحانی بابل)
- ۲۲) بررسی بروز نارسایی آدرنال در بیماران کانسری تحت درمان با کورتیکواستروئید سیستمیک در بیمارستان آیت الله روحانی بابل
- ۲۳) فراوانی بیماری های قلبی-عروقی در میان ورزشکاران حرفه ای شهر بابل طی سال ۹۷-۱۳۹۶
- ۲۴) اثرویتامین D با سطح فعالیت در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
- ۲۵) بررسی فراوانی اختلالات تیروئیدی در زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بقیه الله تهران در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷
- ۲۶) مقایسه درمان ۵ روزه و ۱۰ روزه رژیم concomitant بر پایه لوفلوکساسین با یا بدون پروبیوتیک در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور
- ۲۷) بررسی اثربخشی تعبیه ی cardiac resynchronization therapy-device (CRT-D) روی میزان کسرجهشی بطن چپ (LVEF) و ظرفیت حیاتی بیماران در بیمارستان آیت الله روحانی بابل
- ۲۸) مقایسه اثر بی حسی وریدی منطقه ای و بلوک اسپینال در جراحی های پا
- ۲۹) ارتباط بین همزمانی کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری در بافت های هایپرپلاستیک آدنوتونسیلار و عفونت معده آن در کودکان
- ۳۰) نتایج آندوسکوپیک و دموگرافیک در بیماران با آروغ مقاوم به درمان در سطح شهر بابل، طی سال ۹۶-۱۳۸۵
- ۳۱) نتایج هیستولوژی نمونه های CNB در ضایعات ریه با تشخیص بالینی کانسر برونکوژنیک و عوارض آن با توجه به لوکیشن ضایعه در ۵۰ بیمار بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل
- ۳۲) مقایسه مایع درمانی تهاجمی و مایع درمانی استاندارد حین ERCP در جهت پیشگیری از پانکراتیت